

通用名称：培哌普利氨氯地平片（III）

商品名称：开素达[®]

成份：本品为复方制剂，其活性成分为精氨酸培哌普利 10mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）5mg

适应症：本品用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的培哌普利和氨氯地平联合治疗下病情得以控制的原发性高血压。

规格：每片含精氨酸培哌普利 10mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）5mg

用法用量：口服。每天一次，一次一片，建议早餐前服药。（详见说明书）

详细处方信息请参考说明书。

通用名称：培哌普利氨氯地平片（I）

商品名称：开素达[®]

成份：本品为复方制剂，其活性成分为精氨酸培哌普利 5mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）5mg

适应症：本品用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的培哌普利和氨氯地平联合治疗下病情得以控制的原发性高血压。

规格：每片含精氨酸培哌普利 5mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）5mg

用法用量：口服。每天一次，一次一片，建议早餐前服药。（详见说明书）

详细处方信息请参考说明书。

通用名称：培哌普利氨氯地平片（I）

商品名称：开素达[®]

成份：本品为复方制剂，其活性成分为精氨酸培哌普利 10mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）10mg

适应症：本品可作为替代疗法用于在相同剂量水平的培哌普利和氨氯地平联合治疗下病情得以控制的原发性高血压。

规格：每片含精氨酸培哌普利 10mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）10mg

用法用量：口服。每天一次，一次一片，建议早餐前服药。（详见说明书）

详细处方信息请参考说明书。

通用名称：培哌普利氨氯地平片（II）

商品名称：开素达®

成份：本品为复方制剂，其活性成分为精氨酸培哌普利 5mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）10mg

适应症：本品用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的培哌普利和氨氯地平联合治疗下病情得以控制的原发性高血压。

规格：每片含精氨酸培哌普利 5mg 和苯磺酸氨氯地平（以氨氯地平计）10mg

用法用量：口服。每天一次，一次一片，建议早餐前服药。（详见说明书）

详细处方信息请参考说明书。